

## Instrucciones postoperatorias de endodoncia

### **Cuidados postratamiento:**

Es normal sentir algo de sensibilidad en la zona durante unos días después de la endodoncia o la apicectomía, ya que su cuerpo experimenta el proceso natural de curación. También podría sentir algo de sensibilidad en la mandíbula por mantenerla abierta durante el procedimiento. Estos síntomas son temporales y responden bien a los analgésicos de venta libre.

- No coma nada hasta que el adormecimiento de la boca desaparezca. Esto evitará que se muerda la mejilla o la lengua.
- No mastique ni muerda el diente tratado hasta que su dentista lo haya restaurado por completo.
- Asegúrese de cepillarse los dientes y usar hilo dental como lo haría normalmente.

### **Qué esperar después de la terapia endodóncica:**

No es raro que un diente sienta molestias o incluso un dolor sordo inmediatamente después del procedimiento. Esto se puede controlar con ibuprofeno o paracetamol y debería desaparecer en unos días.

- Su diente puede estar sensible a la presión al morder e incluso puede parecer flojo. Esta sensación también desaparecerá en unos días.

Es posible que haya un empaste temporal blando en el diente; no se alarme si este empaste se desgasta o incluso se cae antes de su próxima visita.

Intente masticar del lado opuesto al del diente tratado hasta que le coloquen la corona. Hasta entonces, sus dientes están debilitados y podrían fracturarse.

Evite masticar chicle, caramelos, palomitas de maíz u otros dulces blandos y pegajosos que podrían desprender el empaste temporal o fracturar el diente.

Si le recetan antibióticos, tome TODOS los medicamentos según las indicaciones.

**SI TIENE DOLOR PROLONGADO O INTENSO, HINCHAZÓN, SANGRADO O FIEBRE, LLAME A SU DENTISTA INMEDIATAMENTE PARA SOLICITAR UNA CITA. 978-878-8100, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.**

Fuera del horario de atención, acuda a urgencias.